醫

月月

棒

喝

11 111 111 1111 日録	評慈航集	評温病條辨		温暑提綱	方制要妙論	麻柱青龍湯	辨貫珠	醫門棒喝卷之二目録
7.1.1.1	集	條辨	<b>1</b> 달		妙論	龍湯解	辨貫珠集温病傷寒攙混之誤	之一
録		附答問	<b>温投</b>	春温		/ <del>]</del> '\   	<b>妈</b> 傷寒	録
		問	附答問	風温			機混ツ	
			(rr)	暑温		1 7 3 1	之 誤	
				濕温			1	

	虚損論 附辨假處	千金方房術論
	附辨假虚損 治案 温暑治案	

邪客陽經者用麻桂柴萬等湯客陰經者用姜附細 仲景傷寒論萬世之準繩也但中有温病各條攙混 不分此而錯誤害實匪輕兹考治傷寒大法初病時 辨貫珠集温病傷寒攙混之誤 棒喝卷之一 ・井田町、内倉が年の鹿児ケー具 會 陰 稽 受其 雪帆 居士田晉元評點

熱故論 以惡寒爲表邪未盡也叉如邪傳少陽而太陽證 裏寒熱不可混也然必在表寒邪已盡方可直清裏則寒邪化熱始以清凉之法治之此由陽經傳裏表 而出也倘失于踈解邪傳入裏或因其人陽氣有餘 以托邪俱用辛温之法因 類蓋寒為陰邪傷人之陽 用小柴胡湯以人參固陽防其邪之入裏即 日微惡寒者雖有裏證不可攻下宜先解表 邪由表入必使從表

丁中。您您說治大旨已括

**跨月奉場一般二辨温病傷寒摧混之誤** 

柴胡湯之類也從未有不顧表邪而但用寒凉清裏 之宜辨者凡此皆仲景之心法教人萬世遵守者 陰危殆立至矣其元氣素弱之人衞陽不固或初感 出若率用寒凉更傷中陽使表邪乘虛內陷陽證變 者良以寒邪旣傷表陽全賴中陽喔盛庶可驅邪外 寒邪卽入陰經則不可踈散更虛其表必用姜附温 表證未罷而裏證亦急者必用表裏兼治之法如大 扶陽, 如四逆理中之類其邪自解此又陰陽虚

陽經傷寒正治法內列有合病六條前三條用麻葛 起治法冰炭不同矣吳門七在涇先生集傷寒貲珠 等方自是傷寒正治之法乃第四條太少合病自下 而用黃芩湯第五條三陽合病而用白虎湯第六 一陽合病有證無方考本論中原有柴胡桂枝湯 熱陽邪傷人之陰故初病卽宜凉解與傷寒初林旦下 書將仲景之論分為正治權變斡旋等法其太

國 及可 是 另一辨温病傷寒機准之誤 其表若表已解而邪人于胃寒化為熱則不惡寒而 邪未盡即有一 温 初張路玉先生集傷寒纘論獨謂此數條是仲景論 **反惡熱方用白虎承氣等法以清其裏是表寒爲致** 入生變耶此等疑義註家從未剖析後學莫識其端 解散乃不此之用,而反用黄芩白虎豈不畏表邪 熱病證治註家不辨混入傷寒例中此語洵足振 分惡寒故雖兼裏證仍當温散先解 燈綠傷寒之邪自表入裏有一分表

先生之後不知折衷乎此 陽逈異豈可稍容牵混哉獨怪夫貫珠集著于路 之標即或非伏氣蘊釀凡感温熱終是陽邪故雖 發、 其裏則表熱亦除是內熱為發病之本表熱為傳變 未病時已鬱而成熟 之本裏熟爲傳變之標 之人亦須凉藥 清解則與傷寒之邪標本不同 旦觸發勢如燎原故急 若温病由伏氣者邪自 而循消黃芩白虎列于 陽 陰 内

豊 **序既紊傷寒温熱 攪混莫辨故慈谿柯韻伯日傷寒 胚舉傷寒條辨尚** 碩 又余之所不解者、 名思義别具隻眼卽如太少合病三陽合病數修 和之文附會者亦多信不誣矣故讀仲景書必當 門棒喝人卷二 果傷寒邪尚在表理當麻桂柴葛以解之自是仲 可以黄芩白虎為正治之法乎同里唐立三先生 叔和編次已非仲景之書仲景之文遺失者多 論等編而獨推買珠集為最善此 要知傷寒論經後人編輯各條次 四

景成法今既用黄芩白虎可知為温熱無疑若 合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗又曰三陽 治寒邪害熟甚焉 身重多眠睡鼻息必鼾語言難出其合病篇言三陽 又按温病篇仲景日風温為病脈陰陽俱浮自汗出、 合病腹滿身重難 正共名列于傷寒。正治法內後學不察妄用凉藥以 自汗出者白虎湯 主之按此言脈陰陽供浮者陰 轉側口不仁面垢讝語遺水若

降月 妄 By ( ) 是二 邪盡矣若太少之 語言難出而息鼾或鬱勃于中 寒熱惟傳入陽 上矣其自汗身重多眠睡大畧 太陽之 除皆當次于風温、 ? 邪未盡 則遺 辨温病傷寒機能之誤 合并三 明方不惡寒而反惡熱則太少之 邪不盡必用麻 必有惡寒少陽之 條後斷非傷寒之合病也失傷 也卽 陽陽盛之 此數係合觀、 桂 則擾 相 邪未盡 同或 極故脈浮大 則三陽合病、 1. 河明面 風火 不當 必有 脈

**反**我推敲

義理俱盡

者必非傷寒之邪更可見也然又非傷氣傳裹變熱 鲁月木口一名二 芩白虎今既稱三 陽合病太少合病而用白虎黃芩

少邪盡太少邪盡則不當稱太少合病三陽合病矣 之證也何則傷寒傳裹變熱而用黃芩白虎則必太 如論日太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主 下利但嘔者葛根加半夏湯主之考葛根湯重 合病也其云太陽與少陽合品 風寒佐廿芍姜棗和中而調營


和 後學之家使仲景之 能慎言外之旨庶足 **道如日歷中天其功** 以發古人之與而啓 宋 位 哉 轉尤

為人妙詩書 散之藥反用黃芩 應以前方去莉易 此 病。 二條既用黃芩白 利與上 月 仲景微旨欲 人 寒熱者。 17 M 陽 (2) 虎、 柴胡方為合法、 非。 白为 陽 辨温病傷寒提混之誤 發 傷。 何 必っ 耳聾等 非傷。 與上 陰凉之品 故 神會蓋謂 翀 可名 寒合病實爲內發之。 條 邪。 |陽合病太少合病| 同若 小 何 **乎由是视** 陽 雖有發 絕無 病 热 無惡寒 虭 温。 用 痛

傷寒雜病本為一書 表條次序系亂以致 系法失真質為干古 東法失真質為干古

黃芩白虎直清其內故特于首條揭示日太陽病發 見此數條之太少台病三陽合病實根首條而來推 管甲 核 以 名二 熱而渴不惡寒者爲温病也發熱頭痛者名太陽病 必有太少合病三陽合病之温病也又何疑哉益可 而至于三陰亦必有温病也總因後世忽略混入傷 也渴者內熱熾盛也不惡寒者非外感風寒也旣有、 太陽之温病亦必有少陽之温病陽明之温病也亦 點出而不省察猶循舊章亦五

愛門處場		豈可不辨而 致誤哉	同或不細辨	之一失也然
受到引 泰 羽 人 长二 辨 温 病 傷 寒 撲 混 之 誤 七		致誤哉.	循可其在陽經則傷寒温病治法追殊	《傷寒變熱傳入三陰其證治與溫病大
			迎殊、	<b>病</b> 大



醫門 | 卷二 麻 性 青龍 湯 ¥ 昔人皆言仲景麻黃湯治寒傷營桂枝湯治風傷衛**、** 以營衞風寒立法而辨析精微用法圓活若穿鑿其 雖 說使淺學膠柱而不通變反失仲景之意也蓋風未 衛陽被室故腠理 性踈泄而營陰被擾故津泄而汗出豈不傷營乎、 大綱如是不可鑿也鑿則經義反隘矣夫仲景雖 不傷營寒亦何嘗不傷衞良以寒爲陰邪性凝飲、 麻桂青龍湯解 閉而無汗豈不傷衛乎風爲陽

鼻干不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱 · 吃戶大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通 脈證以期藥病相當而已卽如論中云陽明病脈浮、 無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯叉曰陽明中風脈 中風互辭表義而有靑龍麻桂各半等湯則必辨析 耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者 寒風多則寒從風之踈泄而汗出故仲景常以傷寒 寒必挾風寒多則風從寒之凝飲而無汗風必挾 脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯 明兼少陽證故宜小柴胡和解若脈但浮無餘證者、 也中風而無汗又可見風必挾寒也論又曰陽明病 又曰中風俱用麻黃湯可見麻黃湯不僅治寒傷營 無少陽證也而 小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯按此係本 日太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯夫陽明太陰、 肉非如太陽之可分營衞乃或用麻黃或 用麻黄湯發汗以上兩條旣日陽明 1

第月 表 月 | 老二 躁者大靑龍湯主之叉日傷寒脈浮緩發熱惡寒無 夫曰中風風爲陽邪性踈泄則脈應緩而升出乃 **緩皆無汗煩躁正表風必挾寒寒必挾風之證治** 爲傷寒今言太陽中風而脈浮繁又曰傷寒而脈浮 湯發之按本論云脈緩汗出者名中風脈緊無汗者、 汗煩躁身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍 桂枝叉可見桂枝湯不僅治風傷衛也又如太陽箭 云太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩

能 心肺 大青龍楊方義者鮮 營衛 動不得外泄必为擾 氣脈 則惡寒無汗陽邪 知之也 而煩躁從來 Ú 在 資資那 心肺在 例 解 閉 性

內 陰 勝、 挾 肺、 仴 寒邪、 陽 污紴 亦有煩躁 也,此。 而, 煩躁、 邪、 是挟 陰 故 身重之 **M** c **營通于心衞通于肺** 뿃, 鉱 有 邪。 III 觓 III 垣。 但 邪 證 也, 重, 閉營衛 則不, 重者) 陰 不。 癣o 兆 頭,痛, 凝滞氣 故 膀, 煩躁 而、 故也又日傷寒而 ılıı, 脈、 乍、 riji.s 身當疼痛 微、 III 細或下 無汗 陽

反方

加

煩躁者

心。肺。

们。

腹

痛當用

附

温

斷

不

<u>u</u>]

誤

投

清龍

無

**T** 

水氣作逆則去石膏之寒易姜半細辛之温迥陽 龍湯為麻桂兩方之變法也若內無陽邪之擾而有 如龍之興雲作雨使煩熱鬱蒸頃刻清肅故名大青 陰邪之閉經脈流通津液周布則汗出而邪**泄矣** 酸攝易石膏之辛寒內清心肺陽邪之擾外解營衞 大青龍湯旣是風寒兩傷合用麻桂兩法去芍藥之 也與上條同為太陽經風寒兩傷營衞之證故 表裏分跪不取其大汗故名小青龍是叉大青龍 オエ ヺ 均 用

故用麻 使邪軍 仁甘草石膏湯此因 杏仁降氣甘草石膏 大熟者可與麻黃杏 枝湯若汗出而喘無 亦有 或下後不可更行柱 |如論中云發汗後 汗 近開 塞班 用市 东 竅佐 而喘

出而用麻黄 爲風寒初 桂枝湯有芍藥之欽 山 力弱不能表散陰邪也 顧可穿鑿其說而膠柱鼓瑟乎 一變法也嗚呼仲景辨證之精 而 更發之則必大汗亡陽矣 泥穿鑿必審其脈證宜否 用麻黃以麻黃湯發散 犯 太陽證治 ..., 麻桂青龍湯解 也既已無 過網領要 雖當辨 (無汗 在辨其有汗無汗 須知麻 别 而更 風寒營衞而 猛也既 桂丽大法 用桂枝 )則桂

造可拘故 虚 不 自 是 而 日 有 汗 不 得 用 法 養 注 则 雅 有 汗 不 得 用 法 養 在 的 是 可 拘 成 有 汗 不 得 用 是 不 就 不 可 拘 泥 不 可 拘 泥 不 可 拘 泥 不 可 拘 泥 不 可 拘 泥 不 可 拘 泥 不 可 拘 泥 不 得 用 法 登 化 对 成 质 声 点 思 不 可 拘 泥 不 得 用 法 查 有 开 不 得 用 法 查 有 开 不 得 用 是 不 市 市 市 下 不 得 用

൬

分風寒之多少是中行方氏 之陋見今子亦云

12

Ħ:

枝

明光之

此仲景心法也或曰韻伯柯氏言風

寒

~兩傷營衛、

勝為行痺寒勝為扇痺濕勝為着痺豈非有多少 得非仍方氏之陋乎答日六氣之 獨風寒為然經云風寒濕雜 至 合而成掉又日 邪中人無不 風

寒風則傷衛寒則傷營營衛俱 同者乎叉不見仲景云服浮而 **手** 字既日中 風 病骨肉

A Transfer Control of the Control

浮緊

出

可與則治風

之

固

미

以治

¢

L

Į

. ►

•

蘇陸西流易幹

\*

則

湯非質表プ

陰陽

不同

治法自

異故

仲景

桂

枝本

解

營衞 實用 營衞但當分表實 氏 則必至牽混 麻黃表虛用桂 陋 見皆聖經之明文也 風 寒兩傷營衛之證治 此 誤 治 何 故 、 表虛有汗炎 枝、 雕 似 得 爲 且 平由 風 表 柯 / 虚無汗為 大綱若不分風寒 爲 氏言不必分風 是言 陽 邪寒爲陰 之固非方 表質表 寒

名為虚實 可見當分風寒不可

而反汗出者正是表虚豈可用桂枝解肌之法乎若

多自汗而治法逈異有用白虎承氣者倘不細辨 說未能盡善不合仲景之旨也仲景立法惟憑脈證 表而又用解肌之法豈非更使其虛乎又如陽明證 謂風傷衞而自汗者爲表虛何不竟用黃芪桂枝實 以自汗為表虚則牽混之誤害孰甚焉可見柯氏之 而施麻桂兩法以後變化甚多方氏獨以靑龍麻

等條可發汗宜桂枝湯則桂枝湯不 翻門隊 一發散之品乎如果能監麻黃不使大汗則桂枝爲 多信 不解者、 插 枝 外監 之品矣何以解經旨乎且如仲景所云陽明太陰 用 場。一卷二麻桂青龍湯解 以吳門王晉三之高明循沿襲其說而 內經言辛甘發散為陽 **麻黄之發表不使其大汗亡陽此皆子之** 劑即陽明太陰脈浮有 枝、 因麻黄發汗其力最 桂枝辛甘 猛故用桂 是有此自 獨寫 먎 而温. 太陽 風 收 世 所

1

發古未發之義

邪反從辛温之藥變成燥火故必吸粥資津液以

必用辛温而津液已耗則不足以滋激化汗或恐风

若謂其能監麻黃不使大汗則桂枝湯中叉佐芍藥 飲其液此芍藥為監桂枝而設則是矣然表散風邪 枝祛散風邪叉處疎泄更甚故佐芍藥收攝營陰以 之飲焉能發散表邪叉何以解仲景之論乎當知風 力雖不及麻黃湯峻猛其為表散外邪之方則 邪踈泄營氣不固津液外走而自汗旣不能不用桂 也。

醫門棒 喝 卷二麻桂青龍揚解 無汗麻 助以桂枝則不能開泄營衞而社之使出 黄力雖猛而氣味俱薄止能 表此確然也豈有辛温發散如柱 用藥無異武穆之用兵品不必多而制法發 不使大汗之理乎以其陰邪凝滯若非麻苦 枝之色赤入營者引領麻黃祛 邪隨汀去矣若寒邪凝飲營衛 則津液丙存故不須毀粥而自能作汗 古 枝 不能 反能監 助

英知所向矣 他明理二字實難非 他明理二字實難非 所見理多有未徹者 所見理多有未徹者 所見理多有未徹者 所見理多有未徹者 以聚訟紛紛使後恩

後学	小徹者	営家	難非		
卷 惑也再俟明者詳之 	奥而故爲曲說流于隱僻則反晦其理而增後學之	答案其淺深者得其深則無不受益今疏解其方欲求深	窺見 班然方法雖妙而理卻甚直故學識淺者得	一二味則證治逈殊由此類推各方變化之妙亦可	化神妙不可言盡即如麻黃桂枝青龍等湯更換止

合制度實不外陰陽五行之理耳蓋薬性有四寒為 桂枝能監制麻黃之發表何况世俗淺學無怪乎疑 為萬世祖其制方要妙更有出于七方十劑之外者 古來多不體究雖稱名家如喻嘉言而循昧昧反謂 其義設為十劑日宣通補渴輕重滑牆燥濕然仲聖 內經有七方之制日大小緩急命耦複徐之才推廣 方為夾雜不敢用也要妙者藥性氣味也配

塩 門要決聖道提綱由 必然清深思洵為人 此論自首至終析理 是致力庶免邪僻之

陽温爲少陽凉爲少陰氣有五氣腐走腎腎 方制更妙論

 $\overline{\mathcal{H}}$ 肝苦先入心甘先入脾辛先入肺 屬 臊 走腸胃三焦能化氣利水也夫人稟陰陽 氣腥走肺肺屬金味有六鹹先入腎酸先入 走肝肝屬木氣焦走心心屬 淡無五味故不 火氣香走脾

性氣味之殊配合制度未得其法反與

治偏必歸于平而後病愈若不明陰陽五

生氣有偏駁則病藥得陰陽五行之偏

一則營為 藤間 為 以軀壳分陰陽則淺深層次而有六經其極表在 也即以 陽以氣血 極裏也然軀壳臟腑本來一 進則爲太陰爲少陰爲厥陰厥陰者六經之 太陽稍深在肌肉間為陽明又近筋骨間 陰衞為陽以臟腑分陰陽則臟為陰腑為陽, 人身分陰陽則臟 分陰陽則血爲陰氣爲陽以營衛分陰陽 . 方制要妙論 腑在內為陰軀壳包外的 一貫故太陽經內通膀胱

醫門 臟厥陰經內通心包肝臟也人與萬物同稟陰陽 陽氣焦香爲陽腥腐臊爲陰味辛甘淡爲陽鹹苦酸 分各從其類也藥之氣爲陽味爲陰氣味又各有陰 **臟**骨屬腎臟太陰經內通脾肺臟少陰經內通心腎 行之氣故藥之陰者能入人身陰分陽者入人身陽 肌 肉屬于脾臟少陽經內通三焦胆腑而筋屬 者動而升浮所謂本乎天者親上陰者靜

欲登仲景之堂其可 宣初仲景之心法以一 有去陰陽五行之理 不由是而進乎 而揭其支妙如此者

學·克利也學者則走裏迅急而通利此承氣湯所以能破邪熱內結 泄此麻黄湯所以能治陰寒外閉也沉降而兼寒凉 于臟之不一是故升浮而兼温熱則走表力猛而發 專用其味取性之寒凉以治熱陰寒之邪在人身陽 也是麻黄湯專用其氣取性之温 陰厥陰經之分沉降之力有輕重故或入于腑或入 分故以走人身陽分之陽藥以治陰邪陽熱之邪 于人身有淺深不同故有人太陽陽明少陽太陰少 与利更少前 熱以治寒承氣湯

醫門 陰陰陽通和則邪去正安此渴心湯所以能治痞滿 混淆陰陽否隔而爲中滿者則用生姜干姜温熱而 升浮者通其清陽黃連黃芩寒凉而沉降者破其濁 人身陰分故以走人身陰分之陰藥以治陽邪皆爲 升浮不甚走表叉以芩連沉降之力制之遂為表之 也但生姜干姜則味厚非同麻桂之味薄輕揚故雖 正治之法也若非陰寒外閉又非陽熱內結而邪正 棒喝一卷二丁龍雪女言 心黃芩黃連氣味清不及大黃之味厚質重故

新月 三五岁 氣香而 迟利者以開濁邪但大黃 味厚下行急速 泄濁邪遂別出心裁不用二姜但 多則二姜之熱恐助邪勢而芩連沉降又不足以開 是用寒熱調陰陽氣味通淸濁也如或其人 成秦故以<u></u>

英連之寒二姜之熱二 之表藥也表之裏裏之表正合乎 中矣邪不在表又 不在裏則不宜表裏之法惟轉其陰陽樞紐則否變 、1.1.方制更妙論 一姜升浮 以黄芩易大黄之 者均之適得其平 之力行之遂爲裏 陽盛熱 則

黃芩連漬取其汁峻潟中上之邪 以扶元陽附子煎熟則達腎甚速不礙于上、 中道之邪仍畱不盡乃不用煎法 **医**月 起 见一卷 邪故仍名大黄潙心而不名承氣 **兀陽叉虧而畏寒汗出補潟兩難** 出而氣厚味薄味薄則下行緩氣厚則上浮以泄 力多不傷于下扶陽泄邪、 于味厚乃不煎而漬取其汁此眞意想天開 別煎附子汁和 也若邪熱雖盛其 莫可措手乃以大 以湯漬取汁則味 舉兩得欲用其 三黄生

投無不效而七方十劑之法亦一益具于中夫陰陽 聖歟觀此數方之妙則可知各万變化無不以藥 行之理微妙難言而變化無盡藥性氣味雖同而 氣味之陰陽合乎人身表裏陰一份虚實寒熱者是故 薄不同則功力各異病因證狀 同則治法自殊此所以 門棒場一統二 藥以治之也必神明乎陰陽五行變化之 方制要妙論 一藥可以治泉病 之嗚呼斯其所

能領會也能知為心湯之妙即可悟烏梅九之理而 仲聖之法固非某藥可治某病而不知其所以然者 者必神明其理豈拘拘于藥品哉明乎此始可與論 配合制度以成方而後始能效是故善用仲聖之法 理。 方不可數計能望仲聖項背者蓋亦鮮矣惟近腎 ·諦審病之陰陽虛實權衡藥性氣味之輕重厚滿 通加人尿胆汁附子與大黃同用寒熱補瀉錯雜 以貫之自無夾雜之疑惑矣後代名家制

野門棒喝 老二 力制要妙論 深之層次則病有淺近深遠之不同故制方有大小 陽氣味厚重者能减除人身之濁邪人身有表裏淺 輕重之別也十劑日輕可去實實者非堅實之實謂 制小其服達而奇耦制大其服又日因其輕而揚之 因其重而减之是言氣味輕清者能發揚人身之清 其用西瓜衣花露等品為戲者或以案中無大黃之 力謂先生不能治傷寒者殊不 知內經云近而奇耦 一先生實傳仲聖之心印惜乎識之者尤希或言

清陽 為五方雜處豈無稟厚之人為因先生聲重寰中當 時應接不暇延請甚難若是裏 輕清小劑卽有裏邪亦不須大黃之厚重也然吳門 病質弱則不勝重藥邪淺止可 敗壌難 風乍拂萬物以和也吳人氣 療始延先生挽救雖 放體 板實也輕 證必經他將先治或 清之藥最能舒陽 證則先生理明法 用小劑此所以多用 質薄弱畧感微邪 **稟厚之人證至敗壊** 卽

隆月春場 ×二方制要妙論 家之方先生亦時多取用而因宜裁制無不入妙使 有是證則用是藥無是證則無是藥矣以故後代名 一隨藥而愈必不至內傳而成裏證所以絕無大黃之 印也且先生無暇著作以垂敎僅存臨證之方案耳。 先生權宜變化必以藥性氣味之陰陽厚蔣合乎病 不泥其方藥而神明其理法先生所以傳仲聖之心。 之陰陽虛實而已豈泥象執方者所能窺其藩離哉 方也然雖無大黃之方而承氣之法 原在其中此正 Ē

機殼不謂之夾雜卽謂之戲弄嗚呼與所謂醯雞笑 天夏蟲不可以語冰者也又何足道哉 之理因時變化之宜一見奇妙之方茫然不解于中 而在南方豈不審人之氣質而概施重劑乎若記一 先生而居北地則方案之藥自必厚重者多若仲聖 一陳方但知某方可治某病全不識氣味陰陽配合 元按仲景日病發于陰而反下之因作痞是痞者 F 木口 / 分二 誤下而成也蓋六氣之邪本皆無形入于腸胃


制法之精妙通乎造化之微非得仲景心法其誰 其旨謂此方必有訛誤况其下者乎今先生揭其 其妙眞有不可思議者以柯韻伯之高明循未識 濡正傷邪結攻補兩難而仲景出一附子渴心法. 腸胃者攻下者邪未入腑而誤攻之反傷將肾元 表邪反陷入而成痞滿然非有形實結故按之則 陽其稟弱者必致畏寒汗出有亡陽欲脫之象其 與濁牌凝結而成形質必須硝黃質重迟利直走 

能明之且諸家有以畏寒汗出解作表陽虛者而

斷不能走表也另煎熟汁和入取其直達下焦專 其功亦能固表今與芩連大黃苦寒之味同用則 固元陽更可見矣先生自言讀葉氏醫案而悟仲 附走裴之品以救根本若表陽虛但用固表之法 可矣何須用附子乎且如附子與桂枝參芪同用 不知痞由誤下而成誤下必傷脾腎元陽故用熟

景之旨尤可知葉氏實傳仲景之心印而先生

者以發矣、語其
此未
者矣 以語此是豈 ¨ 之私見哉天下後世要必有知之以語此是豈 ¨ 之私見哉天下後世要必有知之
之葉私氏
之私見哉天下後世要必有知之葉氏之燈然非箇中人則又不足
大然
後
安 八 則 元
知公



総一温病而分別源 流不同則治法逈殊 如仲景之分風寒治 法有麻柱雨方之異

温三日暑温四日濕温五日瘟疫春温者經日冬傷

于寒春必温病又日冬不藏精春必病温此因伏氣

温暑提綱

温病源流當辨别而分治者有五一日春温二日風 異傷寒傳裏變爲熱邪則治法與温病大同茲細 夫六氣傷人為病各異必辨其爲何氣之邪治之方 無錯誤如寒爲陰邪傷人之陽熱爲陽邪傷人之陰 一者冰炭尤當辨别是以温病初起治法與傷寒逈

生 三 三

/ ...... 温暑提綱

明六氣流行變化之 理使軒岐仲景之道 **肇混不辨多以春夏** 寒相殊尤甚後人嘗 **誤也而况温暑與風** 偏而昧陰陽六氣之 景之法或舉一隅之 氏瘟疫論等或亂仲 大晦如陶氏六書吳 仲景之論未備蓋不 之病名為傷寒反謂 理该學法之為害深一 藏于肌膚至春發爲温病至夏變爲熱病熱病重于 謂別有温病也温者融和之氣長育萬物豈能爲病 所致也乃吳叉可瘟疫論云世所稱温病卽屬瘟疫 之邪發爲春温病也王叔和撰傷寒例日冬傷寒邪 即爲不安豈有邪藏肌膚全然不覺至春至夏始得 且言冬傷寒邪藏于肌膚人身氣血流行稍有窒礙、 古無瘟字後世以温去~加疒為瘟不可以字異而 温也是故辛苦之人春夏多温熱病者因冬傷寒邪 - 梼児/(卷二

監問 奉刊何 · 公二温暑提綱 之邪發病若謂冬傷寒而春發病為非則春傷風夏 **飡泄夏傷暑秋核瘧等豈皆非與每見秋冬時代暑** 邪發為瘧痢等病者比比皆然又可豈未之見耶又 冬傷于寒春必病温春傷于風夏爲飡池夏傷于暑 秋爲痎瘧秋傷于燥冬生咳嗽統論四時皆有伏氣 經文為非謬指温病為瘟疫殊欠究心故也夫經言 之論似乎近理而實不明六氣陰陽變化之道直開 發病耶余按叔和之言原本經旨並非臆說而又可 蘣

則容受而不覺及時 之氣有偏則能病人 天地氣脈相通天地 人身一小天地故與 適位人身之氣傷旺 可執 區區淺見安可論內 經與自哉譬循匪類匿

氣血周流當其邪伏全然不覺其理有難究詰者又 多病暴死若此論代邪者非獨一端又可豈未讀耶 客于骨而不發至立看陽氣發腠理開叉中虛風民 旦觸發勢多凶暴往往損命可見人身臟腑經絡雖 屋下門オリ 何不思之甚乎又如人之痘毒未發時毫無影嚮一 暑邪發爲温瘧靈樞歲露篇云冬至中虛風賊邪人 如素問論温瘧云得之冬中於風邪藏骨髓至夏受 身名!

本身陽旺故也推之 即病其化熬亦速以 威邪重者雖 化發為温病疾若其 陽旺則人身之陽更 容受陰氣至春天 適因人身陽旺自能 所謂供邪禽病 移氣變而後病發即 肛而勢不 旺斯受陰氣從之而 如冬寒是陰氣偏勝 呐 **八身陽 1**7. 必至 也假 地 間暫 乾嘔或喘者肺氣被遏也但人體質有强弱受邪 多從太陽經始太陽主一 重輕凡邪重而體强者則傷太陽經爲麻黃桂枝 温 證體弱者 **台邪由皮毛而入故身熱頭痛者太陽經證也鼻** 害問間 之理以質之盖冬為太陽寒水司令故傷風寒者 j -不為惡莫知其為匪 心俟殲除淨盡而 ļ 邪從太陽百 加以此思 **入少陰爲四逆白通** 身之表與肺同爲皮毛之 後良民始安耳今試論 也然其狼子野心終至擾 湯器

過時而病者皆然所 四時之氣或卽病或

以或有遇春夏多病 衞不固邪亦入陰仲景曰少陰之爲病脈微細但欲

有秋冬多病而春夏 至秋冬則安舒香或

輕快者皆因其人本 身之氣有偏遇天地

之氣衰旺則有或病

也處谷自註

故此三才一貫之理 或安之不同正爲天 地人身氣脈相通之

野門·棒塊。 卷二

一經爲表裏經脈連接故也如體弱而邪輕者以外

訞

|延醫視之||番無他故惟脈 弱欲寐必認作疲倦助其 重證內氣旣和飲食或亦如常不但傷邪者不覺即 寐也或其邪輕止見脈微細欲寐而無吐利厥逆等

元氣而已又當冬令歸藏之候其邪從經入絡經直

絡橫氣血流轉于經邪伏于絡則不覺也卽經所謂

邪臟肌膚者耳且如風爲陽邪性動而疏泄如桂

陽鼓 熱勢 **積著其臟氣固密邪不能干則伏於脈絡至其發病** 以冬令之收藏受陰邪之凝斂則伏而不顯必待 脈緊 動而後發如冰之凝非陽不化由是推之不獨 陰邪性靜而凝飲如麻黃湯證以寒重于風故 邪輕者為然凡貧苦力食之人衣單耐寒日逐 以風重於寒故脈緩而有汗豈非風性疏泄 奉易一一一品暑提綱 倍重為因邪與元氣究非同類伏於少陰與腎 而無汗豈非寒性凝敛乎若但傷于寒而無風 

和之氣原不病人殊不思靈樞經云虛風賊邪

治案立参看 第四卷蓝石辨後有

> 陽 題十月 鬱 オロアララニ

陽進 勝陽、 虚語 业病 陰退立春以後陽氣漸旺由温而熱若又可所 發之病均名春温也風温者冬至一陽來復則 也其冬不藏精之人本體陰傷至春陽旺陰不 蒸寒化為熱至春少陽氣升熱邪隨發故云春 必致温病類乎內傷若兼伏邪其病尤重然皆 之人春夏多温熱病者因冬傷寒邪所致良 温其蓄之愈久則熱發愈重理勢必然叔和

安月 長 四 一 光二温暑提網 書稱爲風溫經日風者百病之長也善行而數變至 故温和之陽風則生物殺厲之陰風則戕物而有時 合而成多因於邪風風氣鼓蕩衆氣隨之而傷人 令方位之宜否若非其時**令**方位而來者雖非殺 風為諸邪領袖而稱百病之長然風卽陰陽之化氣 化乃為他病也由是見外邪為病常二三氣 風賊邪傷 八威虛風而當温暖之候即成温病故 人致病故四時皆有邪風而春令 三八しも

**後治案皆宜参看** 楊弄治案及虛損論

陰來

斯陽氣漸退長夏濕土司令濕土與相

當與汗皆出勿止此雖同論伏氣之病但自夏

乃名爲暑暑者陽盛於外而陰長于內若

病傷 温暖又為風木主令故風温之病較三時為多若 書所稱温熱冬温等名皆可以風温二字該之蓋冬 **病是以不須另分名目也暑温者素問熱論篇日 令温和未必為病必中邪風而成温病温重郎成熟** 寒而成温者先夏至日為病温後夏至日為病

**醫門棒喝一卷二温暑提綱** 温也兼伏氣者病必倍重嘗見有發病一二日卽昏 內熱則汗自止若止其汗則熱反不泄故不可止而 狂大渴吐血衂血者若僅感時令之熱而非蓄邪深 火者熱從火熾濕隨汗去是暑而偏於火盛皆名暑 重何至如此迅暴卽叔和所云冬傷寒邪至夏變爲 **內熱亦隨汗解若無伏氣而但咸暑令熱邪體質多** 已深而發病於暑濕之令熱自內出蒸汗外流淸其 而至遁至否陰長之象也如人本有伏氣之邪蓄熱

證多端皆濕熱為病是名濕温也以上四證源流不 熱病熱病重於温者是也濕温者夏咸暑濕及四時 共病邪較風温等為重考素問六元正紀大論日長 氣主客流行互相剋制或兼穢汚之氣蘊釀而成故 温病而體質陽虛多濕者則熱爲濕遏不能宣達濕 重痠疼或爲瘧疾或爲渴痢或爲黃疸或爲痺腫變 因熱蒸蘊釀膠粘故最淹纏難愈或胸腹滿間或體 同各當辨別而治至於瘟疫叉屬大異蓋由五運六

疫也瘟疫病發往往一方相類如經所云遠近咸若 咸若濕蒸相薄雨迺時降已亥之歲終之氣流水不 厲者狀其氣之暴厲而與尋常有別即後世所稱瘟 冰地氣大發其病温厲按古無瘟字溫瘟義同所謂 戌之歲初之氣地迺遷氣.迺大温民.迺厲温病乃作. 也由是可知瘟疫一證固非吳又可所創論內經已 死丑未之歲二之氣大火正物承化温厲大行遠近 卯酉之歲二之氣陽迺布物迺生榮厲大至民善暴

竟謂瘟疫與公氣無涉者豈天地問六氣以外更有 瘟疫既悖經旨而誤後學其害多矣可不辨乎方書 **麽麽言之仍不出六氣錯雜所致而與温病不同者** 他氣軒岐不知而又可獨知之乎可見不明六氣變 在厲之一字豈可謂温病卽瘟疫乎又可復言風寒 化之理遂亦不辨伏氣發病將春温風温等概指為 暑濕等為 天地之常氣瘟疫乃天 地别有一 又有瘟毒之名亦卽經云温厲之意曰厲曰毒不過 一種厲氣

頭門 奉母 公二温暑提網 燥之類也除正傷寒遵仲景成法外其四時雜威或 寒而成寒燥則宜温潤如麻黃湯中用杏仁以潤肺 狀其邪之凶暴卽瘟疫 **ル出如上** 熱葉焦發為痿躄之類當宜清潤養陰岩體質多 陰虛多火易成熱燥如經云秋傷于燥冬生咳嗽 所敘五證而五證所化之病如瘧痢疸痺 而足旣知病邪源流所自辨六氣變 類不必另立名目以省繁 乬

大法春温 謬誤管見所及聊陳端緒尚望海丙明賢誨正爲幸 和中姜棗調營衞化津液而致汗使熱從汗泄但必 其脈必數治法宜清內熱為主如黃芩知母佐甘草 春温者寒邪久伏化熱熱由內發故初病發熱而渴 化之理氣血虛實之殊則權衡論治自不至于混淆 加柴葛為使蓋邪 伏少陰乘少陽上 並非外處故不惡寒或兼頭痛喉疼者皆內火上 17 1 1 使景云羧糖而尚丕层聚者民場病是也 沖

導之出外以少陽為表裹之機樞則內邪得以外出 勃旣久驟難宣達其火內潰或作暴瀉外灼則肢體 藥也再加為根入陽明而止渴解肌肌解而營衞調 往乍寒乍暖木氣或多鬱而不伸故柴胡為時令要 經所謂火鬱則發之木鬱則達之春爲風木司令往 津液化則汗泄而熱去或不知此理見其熱盛過投 痠疼上炎則頭痛 喉痛故加柴胡達少陽之氣因勢

一 一 一 一 一 春温

寒凉過其欲出之勢其熱反甚而難退矣如兼喉疼

端必至難治 散內熱反營經證 過用凉樂則外風不 解表用辛平之品若 如兼外感風邪先須 風易動不可輕用柴胡升提其陽恐致痙厥之變如

四月 梅 喝一卷二 體陰傷春發温病尺脈空虛面多油光其陰旣傷肝 也或熱盛渴甚可加石羔舌苔黃厚內有實滯而便 宜加元參桔梗泄渴宜加白芍去知母恐知母滑泄 秘者可加大黃此皆治實證之法也若冬不藏精,

等輕清透絡之法以宣泄之營衞流通虛多邪少當 初起熟鬱不宣宜用羚羊荆芥鬱金桑葉貝母連翹 以滋陰為主如復脈湯加减便秘加元參知母夾食

盡善耳 海門泰 易 · 矢二風温 風温者四時皆有而春令為多以温暖之候感虛風 氣此大法也虛實補海當細審詳辨隨證權宜方為 冬湯總以甘凉滋潤養陰退熱不可用苦寒而傷正 稍佐消導如枳實山查之類胃弱而渴者宜金匱門 合風爲陽邪而疏泄腠理故初起發熱而惡風寒旋 邪遂成風温而先傷上焦衞分肺主衛爲皮毛之 風 ini H 三

用平散勿可太凉蓋船勿使內傳解表宜

冬稍佐温散總以先理肺氣為主否則邪鬱入營或 氣未伸亦可稍加柴胡為使夏合宜佐凉以救肺秋 即惡熱則不惡寒矣不同傷寒惡寒之甚也或自汗 邪宜薄荷荆芥紫蘇杏仁貝母葱豉之類若春初木 邪故舌苔不厚或微有淡色黃白薄苔先解衞分之 浮大皆陽邪在表在上之證也熱在表而未入裏故 不渴以其為輕淸之邪先傷肺家輕淸之臟內無濁 頭痛顱脹胸悶或咳嗽喉痛脈必浮弦而數或兩寸 日一大二

達表開泄也

十則辨 或變昏痙吳門葉天士先生有論治風温 析營衞傳變之理用法淺深之道最為精詳

宜究心而熟玩之此不多贅

暑 温

暑温者夏至後所感熱邪也古人分陰暑陽暑蓋夏 至以後相火濕土二氣交會合而爲暑或値時令熱

飾

卷傷寒傳經論

遊 或 人 或值時介濕盛或人稟體陽虛而成陰暑之證是見 稟體陽旺而成陽暑之證是暑而偏于火者

虚損論後有治案宜

等月长日至 · 於二暑温

**冷** 則能 以傷寒内傳變熱大 便則燥結暑熱大便 雖不解其解時必溏 邪窒滞故也 生熱故雖同 則能化燥濕蘊 而為病各異所 為

士火而

名暑温者旣為火邪先傷肺金肺主氣氣

屬

于陰

而二氣為病

不同治法

逈

別豊

可混

乎若

佐六

散或益元散以辛凉甘緩之

上法清

津

液耗

而

**渴喜凉飲宜** 

一白虎腸爲主

一小便

故

脈虚

無力

肺

皮毛故皮腠開而自汗汗多火燎

医型 同論 而 **于治陰暑若冷香飲大順散等昧者或與傷寒陰** 偏 Þ١ 于濕 則 杉 大談矣因六氣之中寒爲陰濕亦爲陰 녯 者非同傷寒之 陰證 也背 (毎用 姜 雕 稚 附 同

或吐血衄血必大剂寒凉如白虎三黄凉膈犀角地 之邪并發其勢暴厲一二日卽昏狂大渴或發斑疹 熱如叔和所云冬傷寒邪至夏變為熱病辛苦力食 之人多有之 **蓄腹滿者桂苓甘露飲最妙如汗多脈弱宜生脈致** ·梅喝~《卷二·暑温 **公氣傷宜東垣淸暑益氣湯此大法也倘內有伏** 一承氣等審證選用若僅感時令暑熱而無伏 而喘必加人參或金匱竹葉石羔湯若過 如上提綱中所論者又感暑熱而新 寁

**溏泄頻而不爽小便黄赤短而不利或變黃疸或化** 昏悶胸滿腹膨乍寒乍熱胃不思食渴不欲飲大便 雜氣遂成濕温雖四時皆有而夏秋爲多濕熱一 濕溫者以夏分濕盛或人稟體陽虛多濕而感四時 膠粘淹纏難愈如從下受則足腫體重上受則頭目 可不知此理也 何至如是迅暴故辛苦之人則有之膏粱中鮮矣不 濕温 氣

濕家忌發汗指濕熱在裏者因其膠粘之邪汗之徒 藿香正氣五苓六和消暑九等方審證選用仲景言 邪故寒滯之藥亦不宜用若見腹滿妄用大黃攻泻 泄津液傷元氣而邪仍在反變壤證矣旣爲膠粘之 故宜苦温芳香以宣三焦氣化使小便通利為法 |氣合病也良由淸陽不振陰邪竊踞

醫明極場學都一濕温

則更傷腎元敗脾陽脹必愈甚而至危殆故又不可

**小也其或濕盛熱輕尤當用辛熟如姜附之類使陽** 

美

此類者不可枚舉世俗習焉而不察若

暑通套之方病家不知其害醫者以爲成法可免褒

貶而不知香薷辛淡而熟為暑門發汗之品如傷寒

宜清驅邪養正不可混施每見世俗以香薷飲爲治 氣克振而佐二苓滑石等以泄其濕兼表分者可加 無汗身熱為邪閉有汗熱渴為津泄表裏虛實辨別 瘧痢等各按本門論治可 耳夫 陽暑為火陰暑為濕 有濕熱條辨三十五則論治甚詳宜參究之其黃疸 防已赤小豆木通之類此大法也吳門薛生白先生 

告多矣若黃連寫心火厚朴温中開胃原為治濕熱 門之麻黃也不辨有汗無汗表裏虛實而混用之其

之藥而不可治暑温火盛傷氣之證以其苦燥傷陰 則熱反不退而化燥病矣臨證者幸詳辨之〇以上 四證雖源流不同但有互相兼病者必参合諸證而 ---

**瘟疫者由六氣錯雜穢惡釀成邪旣深重原非輕** 施治法知常通變神而明之存乎人耳 瘟疫

皆月長局で、六一遍変

制曹濟消費飲方是 叉按東垣治大頭編

有質婦人年逾五十 凉潟上焦法世皆遵 用鮮知辨别丁亥春

身發寒熱頭腫如外 日閉鼻平頭以下肢

晦無澤唇舌皆淡白 **診視脈性選無力**商 醫用消貨飲不效糧 體行不睡胸悶不食 投大黄。基尼困逐余

戶板

能治然人稟體究有虚實不同亦不可概施攻擊吳

確將暑濕風温等談作瘟疫而治則病壓藥重城賊 又可論證頗詳而立法未免偏于峻猛或更辨證未

變化之理混指一切温病為瘟疫故也康熙問上元 何堪余見世俗蹈此與者不少良由又可不完六氣

戴麟郊先生推廣吳叉河之論而若度瘟疫論其辨 證要法有五學者最宜記取一日氣瘟疫病氣臭穢

如屍氣與衆病氣不同二日色其面色垢滯而晦

**劉日開腫消寒熱退** 草温中以鮮涼薬服 利隔清痰加干姜甘 屬其丙無匠益国矣 **鲜**主陽經風邪反凉 經也且脈證虛集不 **两剩病减患食叉两** 風佐牛旁杏仁厚朴 乃重用荆防柴葛散 **面腫爲風陰經不上** 微有薄苔余日經言 頭面此風邪客三陽 豪故也有是五者方為瘟疫初用達原飲開泄膜原 路門奉楊 於二瘟疫 者之中止見二三或係暑濕風温等證不可便作瘟 糊不清或弱或伏皆由穢濁之邪壅蔽膜原神氣昏 所苦不能清楚以告五日脈初起脈多沉敷至數模 或黑四日神其心神憤憤似夢似雕瞬擾不安問其 一 疫而用重藥凡治疫病 使邪傳化傳化之後其脈象即不糢糊沉伏矣倘五 日舌其苔厚濁滿舌初起白如積粉旋變醬色或黄 用方中必加芳香逐穢 美

醫多方雜試所有能 想者以此見禍福之 病势既正日心三五 治疑難各病而愈者 未知仲景当者亦不 [3 自知其誤也凡余所 惟苑脈證不執死方 **效難失故仲景重教 脉透但枕古法以汞** 而粥食大進調理数 而愈失治病不辨 色而增益之稱又可為治瘟疫之聖與靈素仲景鼎 至春必多瘟疫之病已嘗試驗者也予觀又可以 者最確尽傷於寒當作冬傷於汗以冬令多暖出汗 時治驗之證自謂千古不易之法遂以一 足千秋又言又可以內經冬傷於寒春必病温為非 乾隆間有山東劉松峰先生者編次吳又可之論潤

切温病

野 一木 リー・カニ 亦須量其虛實未可如又可所謂必用大黃方能祛 邪但將風温暑濕等證辨明庶免病輕藥重之誤也

為力也處各自記 權在造化非醫所能

駁勝復而致諸病因 論至本病等篇數萬 言详論五運六氣偏 **又觀索問天元紀大** 

其編勝抑鬱久則化

是丙經之土疫一證 弧有五行不同故有一 疫化屬面病三氢氧 之分若吳又可所論 金疫木疫水火土疫

| 瘟疫質不明陰陽 六氣變化之理獨逞臆見以內經

為非乃强不知以為知者也若又可而果聖耶旣以

**丙經為非則必聖于軒岐仲景矣不止點足而已使** 

又可而聞此言也不知何以自處乎今軒岐仲景之

平天下後世必有能辨之者三可母贅焉若冬傷於 寒可以改作冬傷於汗則春傷於風夏傷於暑可以 書具在請與又可之論比而觀之果可鼎足千秋否

改作何字乎自古及今果有傷汗之病名否乎余誠 野月 唐祖 · 卷二 温疫 記して

疫之類蓋木火性陽 毎見有朝發夕死或 特以濁邪粘滯故也 **醸成病其發也徐而** 所歸故濁邪滙聚蘊 五枝之邪必有相兼 而容暴也由是可知 者即經所云火疫木 抽搖或香厥而暴厲 而傳三焦土爲萬物 故邪菩膜原走中道 耳 悖夢惕餘邪內畱胆氣不舒宜酒浸郁李仁姜汁炒 或問薛生白先生條辨內有諸證皆退惟目瞑則懲

土為濕化而居中 無人不汗卻未見春必病瘟疫也總之陰陽六氣偏 愈多則經旨愈晦而聖道愈衰後學之或愈甚而醫 能知不悟已之不明反以經語為非過矣此所以說 風愈下則生民之厄愈重也可慨哉 駁倚伏變化多端必求理之所在斷非臆見揣度所 淺陋未之間也且余當客專東高雷等州無久不暖

皆爲疫邪重者沿門 在 在一時而四方各異 比戸皆病故其病形 **有单病變化莫測或** 然則又可且未詳究 者總不出此五運六 為珍脹或爲瘧痢 五證中之 經古不過一時經歷 氣偏駁勝復所致也 方中病狀相類者 一處而四時不同 諮問調 野月麦場/ 卷二·温疫 答問 来 仁 等 之辛辛散為陽酸飲為陰一辛一酸一 答曰藉酒氣之濕熱與郁李之滑利導去濕熱 酸先入肝而能安逸為慮酸能飲邪故製以姜汁 邪取同氣相感之理也驚悸夢惕魂不藏肝棗一 臻妙理然亦不過示人規矩要須隨證變化予卻 則魂安邪去無驚惕之患藥雖平淡無奇製法 陰 陽闔闢之道陰陽闔闢而肝之血氣以 則即製法得宜得不嫌其畱滯乎請示之 |味相和

淺也虚谷自社 反以經論伏邪發病 一切温病皆係瘟疫

B

下オロー

或問王 性皆温熱故當臨證審察或宜佐以凉肝耳 叔 **汽 語 滞 防 其 太 温 蓋 相 火 寄 于 肝 胆 姜** 和撰傷寒例中云冬傷寒邪藏于

子獨宗其說何 合仲景之旨故謂其非若 也

語後世多非之如慈谿柯韻伯之超卓亦謂叔和之

膚 而有發明惟 語原本內 一台 經非叔和臆說况柯氏雖多卓 亦矛盾而不 當即如其論

**落門奉母**人於二答問 消陽熾從內而達外也按此一節旣言外傷于寒 温寒日多而鬱熱深則陽火應夏氣而病暑此陰 叉云但知身着寒而不為寒所病夫身知着寒則 于寒而陽氣足禦但知身着寒而不為寒所病然 不遽發若寒日少而蓄熱淺則陽火應春氣而病 陰中故身不知熱而亦不發熱冬時收藏之令陽 表寒雖不得內侵而虚陽亦不得外散仍下陷入 其人腎陽有餘好行淫慾不避寒冷爾時雖外傷

|| 「本中|| 人名二 伏藏藏則不能變熱 其熱為內陷之陽邪發現試 不知內陷之陽邪發現也按此一節言寒邪不能 藏乎不知原其人之自傷而但咎其時之外傷只 止藏肌膚且能藏者不能變何以時換而變其所 知傷寒之因不完熱傷其不妄凝寒毒之能發熱 寒邪已伏藏肌膚矣因其不發故不覺也又曰叔 則散何以能藏設無熱以禦之必深入臟腑何以 和不知此義謂寒毒藏于肌膚夫寒傷于表得熱

至月天 多一、二、答問 冬氣則少陰不藏腎氣獨沉孤陽無附而發爲温 威之寒亦天地之氣豈反不隨時合而變温熱乎 邪叉何以能藏而至春夏發現豈非自相矛盾乎 問寒爲陰邪陰邪凝 而伏藏肌膚夫冬寒春暖天地之氣隨時而變所 正為其人腎陽有餘或寒邪不重故不深入臟腑 言藏則不能變何不思之甚耶又曰於此見逆 節引調神論所云逆冬氣者即冬不 **敛且不能伏藏則內陷之陽** U L

**應見異議紛紛更有** 經旨後人反欲自逞 如吳叉可之直關經 氣為病之說正合

余於六氣論後答問中已詳其義請更觀之若冬 藏精之義與冬傷寒春病温者有內傷外感之殊 不藏精而病温者本篇提綱中亦經敘明也柯氏

之意謂止有內傷之温病而無伏邪之温病似句 體會經旨如止本氣自傷何以仲聖亦言伏氣之

爲何氣豈本身之氣又有所謂伏者乎由是益可 病以意候之假合舊有伏氣當須脈之此伏者究

見經言冬傷寒春傷風等論四時傷邪過時發完

**近**與 手得非妄誕自於之 固能超於軒肢仲見

		<b>全科之</b>	1 岐仲景
	并不察其是處而概非之也	豈非有外感內傷之異哉自不可因傷寒例之非	與調神論所言逆冬氣則傷腎逆春氣則傷肝等

	•			醫門棒喝 卷二卷品

\_

15. mg 寒者桂枝湯主之不惡寒而渴者均主以銀翹散以 但將風温温熱瘟疫冬温并為一 手太陰此卽葉氏所云温邪上受首先犯肺之旨也 **温疫攺作温疫仍古體也叉謂吳叉可瘟疫論未善** 病之異多有發明其提綱<br />
云凡病温者始於上焦在 氏大意從河間分三焦立法引經正名分晰傷寒温 有淮陰吳鞠通先生名瑭著温病條辨一 評温病條辨 類而日初起惡風 書宗葉

朱精雖有善法與病 論温養證治則辨別 得其旨欲思效法而 寒條中後人未能深 **央不全又多混入傷** 神情乎温着各條關 辨風寒證治微妙入 形治法逈乎不同辨 人有淺深之殊則病 病相當所以仲景之 之不可不精庶與藥 若叉可立法雖偏其達原飲一 當温暖之候卽成風温之病四時皆有温重卽熱病 也故如温熱冬温等名皆可以風温二字括之不必 另分名目以省繁惑惟春為風木司合而氣候温暖 肺竅皮毛肺之合也故肺先受傷人感虛風賊邪而 何故蓋風温為輕清之邪從皮毛口鼻而入鼻為 風温較三時為多耳若瘟疫 一方猶爲恰當不可

125

六氣有陰陽之異感

而達原飲

方過於削伐甚謬子按此論不能允當

屋門

梅啡卷二

所恶也 不無似是而非之說 治離殊理认則一自 其旨則風寒温暑詮 **哈陽之理仲景辨明** 服器二部初能深出 不合無所用之是核| 善暴死等即後世所稱瘟疫也古無瘟字温瘟義同 客流行剋賊偏駁所致如六元正紀大論所云辰戊 所謂厲者狀其氣之以暴病之危速或因穢污之氣 温厲之意日毒日厲總形其邪之惡耳是以瘟疫一 與時令之邪蘊釀而成故方書又有温毒之名亦即 | 卯酉丑未已亥等歲或云氏胤温病或云隔大至民

第月泰局 ( ) ( ) 严温病係於 須達原飲始能開其濁結使之傳化故又可有九傳 4

**设病勢甚重初起即厚苔滿舌邪佚** 

**胰原盤踞深固** 

達原飲開其內結使營衞氣通內邪 病深法淺皆非所宜矣况桂枝湯本治風寒之方用 內結營衞氣壅表陽不宣之故卽使外有微寒而 治 宜且葉氏所云温邪犯肺正指風温而言故肺先受 **瘟疫則病重藥輕疫邪結于膜原而用開肺之法則** 之說應放證狀甚明而與風温大有不同非輕藥所 傷、 **風温已不花合若瘟疫初起或有惡寒多因濁 〜 視銀越散方亦輕清開肺治風温之藥以之治** 木 外達則微寒亦 ħ 邪、

類條 赤或大片為肌肉之病疹係紅點高起麻疳痧皆 病中發疹者十之七八發斑者十之二三蓋斑乃純 可有托裏舉地湯不言珍者混斑珍為一氣也考温 方不善也又上焦篇化斑湯下方論之後日按吳又 以治瘟疫斯則鞠通辨證未清立法不當非叉可之 棗之甘溫反壅氣機平可知桂枝銀翹兩方均不可 散惡寒自除豈可用姜桂之辛熱更助熱邪甘芍大 奉場と公子温前係殊 血給中病也親此益見鞠 通將瘟疫風温混 だっ

者碳濁之邪 矣以其邪· 不辨並非又可不分斑疹也 病 鲣 肺家輕清之臟故初起發熱咳嗽喉疼胸痛顯脹皆 **內者無干故風温之邪** 也、 如邪鬱不解熱人血絡而成珍子疹者手太陰 邪在上也舌無苦或有微鴻黃白苔而 也若再不解則逆傳心胞而變神昏極厥之危證 由肺 3 客于膜原膜原在肺之下胃之上故言 入雖傳心胞熱在血脈與胃之主肌 但有珍面不成班也若遍 濫風温 以輕清之邪傷 内無濁 結 肺

醫門棒喝人卷三 疹相混·也如果瘟疫又兼風温則斑疹互現偶或有 吳叉可所論瘟疫以未見有疹故不言疹並非將班 陽明胃病也如膜原之邪由肺外達則其結已開 苔厚滯以濁邪壅蔽胃口胃热鬱而成斑故斑為 **쬤亦通斑化而掺自消倘用** 然膜原在裏邪結膜原須 開疹亦難化非其法矣若 化必作汗而泄故瘟疫之邪但有斑而不成疹 一評温病係外 風温之邪不兼內濁 用重藥以開裏結則表 輕藥清肺治疹則裏結 岸

故不惡寒與風温之邪由外感者又爲不同鞠通亦 之七八者實爲風温而非瘟疫豈得與又可之論相 混哉又可混稱一切温病為瘟疫是指鹿為馬鞠通 **者為温病是也以其內熱故初病卽渴以邪非外感** 云冬傷於寒春必病温此以伏寒化熱乘春陽上升 而發爲温病故名春温仲景所云發熱而渴不惡寒 瘟疫證則發斑者十無一二故鞠通言温病發疹上 又將瘟疫作風温而治是以馬為鹿其失均也且經

**醫門棒喝**、卷二評温病條辨 匱之文但其自註云陰氣先傷陽氣獨發故但熱! 寒多熱舌干口渴此乃陰氣 寒令人消燥肌肉叉次條論癉瘧日但熱不寒或微 云陰氣 又上焦篇論温瘧一條曰骨節疼煩時嘔共脈 但熱不寒名曰温瘧桂枝白虎湯主之此雖本於金 辨析論治各證源流未清 五汁饮主之以上兩條 先傷陽氣獨發兩證 故立法不能盡當也 先傷陽氣獨發名日輝 論温瘧 一論癉症 如 平、

温塘又日陰氣先傷陽氣獨發故但熱而不寒令 **置論治法文雖不同意不相遠鞠通將癉瘧經交作** 温瘧稍有簡異亦不與癉瘧牽混蓋內經論病源金 異而有內傷外感之分金匱論癉瘧文與內經同論 消燥肌肉名曰癉瘧是温癉兩瘧因旣不同現證各 內經日先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒名日 温瘧註解兩證牽混不分豈未讀內經瘧論耶叉如 下焦篇有一條云秋濕內伏冬寒外加等語牽引經

文作證尤

乖義理子另有素問辨疑

再請明

題散為主方叉可論瘟疫邪結膜原故製達原飲 鑒定何 再按鞠通云凡病温者如於上焦在手太陰故立 主方此如仲景之論傷寒脈緊無汗主以麻黃湯 加、

銀

之輕重各異也夫風温為輕清之 经可用 医马拉 臟故從手太陰始瘟疫為穢濁之 之二 評温病係が 犯故傷胃口 邪傷肺家輕清 3

一級有沂主以桂枝湯蓋邪

既不同威有深淺而方藥

脈


**考覈**精詳

治風温之方矣乃 將瘟疫 并為一 則恐認膈膜爲募原 或問募原在胃之上口 門材リア 非則不自知牽混之誤反論他人短長蓋亦賺矣 手太陰始是論風温之證矣銀翹散皆輕清之藥是 於膜原因胃為水穀之海灣味所歸也鞠通既云從 答日詳原字之義似指 驅売内空濶處也因共空 一說請細悉之以定其處否 如霧中焦如漚下焦如瀆 類而議吳又可之

手えりた 胃上之間矣又瘧論云、 **痛按此言腸胃之間膜** 論云寒氣客於腸胃之 與膈膜逼近由此觀之 腑以外是膜原為半表半裏之界而在肺下胃 旣云內灣五臟則在軀壳以內橫連膜原猶在臟 無濁滓所聚故云如霧 則空澗處無過上焦肺 / ... / 答問 一竟以膈膜為膜原似乎 邪氣內薄五臟橫連膜原 原之下則指膜原在肺 一間膜原之下小絡急引故 而又稱氣海也素問舉疽 胃之間以其蓄積陽氣而 -

四門 構味 一卷二 **昔人謂邪客膜原也因在表裏之界故邪從中道** 重者則必脘痞惡食舌苔厚腻以其近於胃口故 能治哉况著書立說原為明道濟人起見而理 原飲之制旣非手太陰證豈吳鞠通之銀翹散所 輕清之邪受於手太陰經內連胸肺則咳嗽胸悶 而走三焦則表裏之藥皆不宜所以吳叉可有達 而無舌苔或不妨食若感濁邪如瘟疫及濕温之 可若定謂膈膜非膜原實亦相連屬也卽如風温

野門 <b>本場</b> 松二 答問		世之一助乎	信故亦廣求駁正以期大明斯道不亦爲天下後	無窮是非一定故愈辨貶則理愈明余又何敢自
五十			明斯道不亦為天下後	則理愈明余又何敢自



評王於聖慈航集

病之變態莫能測料卽使洞明運氣之理亦不能拘 化之理甚微叉兼人之體質陰陽强弱皆各不同故 其主客運氣轉旋互換相制相生而有勝復偏駁變 未可為憑蓋司天在泉之氣主病有應有不甚應以 近時王於聖先生名動著慈航集醫書惟應痢二 原經立論猶爲合理其所定六十年花甲之方竊恐

子引 医 ヨダーン、いこ 評慈航集

之以測病論治而况於聖於六氣病變之理尚未甚

中矣然則何以見於聖未明六氣為病之理耶觀其 医門核以 卷二 明六氣之理審其因於何氣之邪傳變之證然後方 乎此因寒證用寒 薬之談今將天時以比之、 就日之陽和則漸焦枯更向陰處藏之豈望其發生 春温論日春温者春日過暖萬物發生之時也猶如 明鳥能洞悉主客運氣流行之微妙乎是故必先究 可名病製方而司天在泉之理亦不出六氣變化之 初放偶受霜雪之侵寒冰凍結其花盡獨岩

壽川瑕瑜立辨舍 河 **一种整論治往往** 之妙返觀諸家 理法百行得心 仲景之書荷能 而用其長無免 非故學者必

泛其也 霜降以後春分以前皆有傷寒之證如果審係寒邪 不明 源不同治法逈異旣論春温豈可與傷寒牽混 自當温散否則胡可妄投且寒為陰邪温為 又云寒證用寒藥之誤直是論傷寒而非論香過 凉不可輕投 也而况溫病之中更有源流不同如春温者 奏余按此說比之以春花受霜雪而殭 陽邪 疬

熱由 月泰昌 內發故名香溫也今云寒證用寒藥之誤是 12二許慈航集

經云冬傷於寒春必病温以其伏寒化熟寒春陽

三

高会登易来矣·岂与 是一样以一卷二

耳論中又曰 劑燥火二氣雖係熱邪初病總因受寒而起先要温 瘟 爲陰證傷寒矣豈春温之謂乎又如風温暑温濕温 之病俱當用温藥竟無陰陽之分尤為非 疫等證皆各不同以其非傷寒之證故均名溫病 故 寒邪然後方可滴其燥火要知外逼寒邪肉伏燥 初治宜温散內火亦從汗解矣若據此說則六 風寒暑濕皆係陰邪並非火證俱用温

不明二也夫治病者必審其現證寒者熱之熱治

醫門棒場、卷二 温散乎仲景之法全在審證立方其邪旣變故方藥 氣冬傷寒而春病温者伏寒化熱熱由內發急當清 裏豈可謂初病因於傷寒而仍用麻黃桂枝等湯以 有既成熱邪不顧現在之證反以初起受寒為憑 仍用温散之理如傷寒傳裏變為熱邪必用白虎承 **刅變是以有一定之理無一定之法有一定之方** |氣係熱邪又云初病總因受寒而起先要温散豈 爽隨病變朝夕不同惟求其當而已今既云燥 評慈航集 三江四

施之得宜庶幾無誤豈可稍有偏執哉而况六氣之 執温散之說非但不能作汗必至發在斑爛禍不旋 青龍湯中有石膏亦非純用温散既爲燥火之邪若 逼寒邪內伏燥火此傷寒論中大青龍湯之一 熱等病不啻倍蓰何以見總因受寒而起耶若云外 踵矣內經明言寒爲陰風爲陽而火濕合氣則名暑 病陰陽各異寒者止居六中之一而春夏秋風火濕 定之病無一定之病故方之宜否必當隨時審證 一 記 記

とin nt iul in iul 成温熱是故四時中病外感者風温濕熱十居七 夏但見發熱頭痛卽名傷寒徒執難經傷寒有五之 若大江以南更少正傷寒證寒邪旣輕旋隨時氣變 淺不須用麻黃等湯即不可名傷寒不過感冒而已 而正傷寒罕見二三也可笑世俗無論方土不拘春 病霜降後至春分前則有之餘時縱有暴寒其氣輕 理自不能辨無怪乎以傷寒而作春温也夫傷寒之 **仝將風寒暑濕概指為陰陰陽不明** ....評慈航集 則六氣變化之

辨而治法大異胡可稍涉疑似哉 即不惡寒而變熱以其為陽邪也陰陽之象逈然可 温病則不惡寒或反惡熱或初起微有惡寒一牛日 於胸中害難勝道矣若温病之發熱頭痛與傷寒雖 題門本の 同而傷寒必甚惡寒須俟邪解方休以其為陰邪也 已多若再以諸病總因受寒而起先要温散之論橫 醫理精微通子造化若以庸庸之資雖研窮畢 語因名味實六氣不分陰陽不辨以藥試病淆誤

M 1 を ヨタ 一、こ 評慈航集		世嗚呼可不愼歟	而非悖經告道仰淺學於	莫識其端豈可以一知也
£17			而非悖經告道仰淺學效法而災及生民流毒後	莫識其端豈可以一知半解輒欲落書立言似是

		と お に か たこ
		ヨニノ

•

.

醫門 降場一卷二千金方房街論 是而實非似真而實偽者其爲害道也大矣正人心 言之顯然悖理人皆能辦之循不足以害道若夫似 書也嗚呼著書固難讀書不尤難乎書之無關人心 而善風俗儒者之書也佐造化而保性命醫者之書 風俗生民性命者勿論其關人心風俗生民性命而 盡信書則不如無害是道賴書以明所以害道者亦 夫言以載道而言之得以流傳千古者書也孟子曰、 千金方房術論 至

儒者醫者皆當如此

為標。則

而準之以理也即如醫門諸子若唐之孫眞

此所以 理理明於心後讀諸家之書則純駁自分眞偽立 亦有不容盪廢者善讀書者要當先讀聖經以明其 也世上 可讀然諸子百家多有羽翼聖經啟迪後進之功 一之書孰有重於斯二者乎韓子日非聖之書 信其所可信不盡信其所不可信必以聖經 1 12 12 1 

人思邈亦可稱亞聖安著有千金方 先生爲醫門大賢疏千金方爲衍義其中闡 國 初張路下 幽豫微

喪。長生之。 等月长 By 10 11 千金方房街論 奇之人 易見貴有賢如孫眞人為此害道之邪說哉必由 尾後立有房中術一條以御女 功難彈 辨其偽妄而反衍之蓋亦千慮之一失也以 之 說 、摭拾附會以僞託耳後賢因過信孫眞人遂 雜 述即有小疵誠非淺學所能窺宜無悖理害 於其間必可信矣乃於二十七卷養性門 而採陰補陽為益壽 

之明始 詳千金之意彼壯年貪縱者水體 您繼又矛盾以圓其說日易兌取象於少女兌悅也 所以遏火之動於妄也君火不妄動則相火守位焉 遇少男艮為咸咸無心之威也艮止也房中之法有 有燔灼之虚發飛走之狂勢也哉然而卒不辨其爲 義焉若艮而不止徒有戕賊何補益之有竊 降生意存焉醫者立教恬淡虛無精 **僧據理而論言人之生心火居上腎水居下** 非向日之靜也 神丙宁

**陸月奉曷 シニーチ金ヶ房術論** 動感而遂通天下之故也此聖人論天理之微妙必表陰陽之象無心之威者即所謂無思無為寂然不 核 熾至於敗德喪命莫能數計甚可悼也夫易以奇耦 致矛盾遂使後世妄人貪生延壽邪說彌增邪行愈 不動之人也荷無聖賢之心神仙之骨未易為也余 著房中之法為補益之助此可用於質壯心靜遇敵 不善惜乎見理未徹不敢直斥爲偽而游移其詞 丹溪之言亦知此力之不能無弊曲為之說意非 生元

為則此心壅滯已蔽其明不能通乎天人合一之理待人欲淨盡而後虛靈明徹豁然感通芍有一毫思 爲乎可哉且言可用於質壯心靜遇敵不動之人荷 人欲之萌也今云房中之法有艮止之義是以恩夫 流行之自然是其背不獲其身則此心寂然無一毫 無聖賢之心神仙之骨未易為也試問旣已質壯 愚婦熾然之欲念比聖人虛靈明徹寂然不動之心 也其云少男少女者用喻陰陽生化之進出乎天理。

證不幾於侮聖言子由是言之孫眞人旣成仙道 取之術何矛盾之甚耶且如道家金丹等書亦莫不 動旣心靜不動則陽何能自舉陽不舉則焉能行採 仙之道者也夫欲念動而陽始舉今日心靜又日不 喪良之事而稱聖賢者乎亦未有採人垢穢可資成 **漏斥採補為邪術何况儒者而反牽引經文為彼左** 棒喝一卷二千金方房術論 斯邪說流傳其爲妄人僞託顯然必不可信 卆

禍則人心可正風俗可善造化可參而性命可保也 丹溪之說似是實非易於惑人尤不可以不辨吾願 則而準之以理勿過信其所不可信庶不貽害道之 天下後世有司命之責者讀古人書當以聖經為標 求吾心之仁而已矣吾欲仁仁斯至矣求在我者 語曰仁者壽又曰仁人心也是故欲得長生者惟 也思者含本逐末肆欲妄為喪其天良本為貪生

至 至 至 至 子 燭 人之識見理明徹者所不能也今觀 旦欲閱其謬而辨其偽使人翻然悔悟則非具 免墮其術中則知世之遵信堅固而不可救矣, 者往往亦為所思故如張路玉朱丹溪諸賢獨 蹈 反速之死誠可憫也皆由邪說流傳昧者不辨 **丈凡邪說之惑人每假聖賢仙佛名目雖有智** 降場 卷二千金方形衛論 析理精微如老吏斷獄邪偽立辨而救焚坯 水火而不將毒害何可盡言夫道高一尺魔高 先生此論 過

S. P.				<u>i                                    </u>		(经)	:
						一普渡	· ;
						爲普渡慈航其有功人心世道豈淺鮮哉	
						有功	; - ;
			i			人心	: !
						世道。	ř
					-	豆淺鲜	
						哉	- 
		1					

當權其輕重緩急而進藥有先後之次序焉但其病 確投劑無功矣夫陰陽之氣稟於腎元生化之權操 治虛損者先辨陰陽次分上下陰虛者最忌助氣陽 化之源臟腑剛柔偏勝之弊則莫知其緒而辨證不 狀變化無方而理法通微入妙若不明先天後天生 此千古不易之成法也其有陰陽兩虧上下交損者 虚者大禁寒凉上損則清金為先下損必固腎為主 虚損論 至.

即此之謂也是故脾胃與腎元並重用雖二而體 脾胃生化陰精以涵育耳經 敗無法可施也然脾胃之能生化者質由腎中元陽 **滋培難經謂上損至下下損過中皆不治以脾胃** 之鼓舞而元陽以固密為貴其所以能固密者又 **平脾胃故腎元虧損稟質不足者全賴脾胃生化** 也 但陰陽雖稟於腎而生生之氣出於肝胆清 而 Þ 也脾土 健 日陰平陽秘精神乃治 運 一而胃氣 陽

或致脹悶或致泄瀉皆由機樞之不利也然則何 若不知此而徒用呆補之藥則氣血愈變反增其困 利之乎曰清氣出於肝胆肝胆木也性喜凉潤而條 不能循度動多室滯故欲培其根本必先利其機 從右而降陰生於陽也此一升 而人身氣血亦應之虛損之人氣血旣虧陰陽運 之機樞而與天地同其造化者故天地節戶有選移 降實為陰陽旋 N 樞

醫門本局 · 二 虚損論

達故宜踈利勿壅遏也宜柔潤勿剋伐也風以颺之

**归**盧者補之|而已 **既悟其理非徒** 

医甲 本 見一 老二

津液周流濁滓下降濁 而通暢暢則飲食以時 脾氣鼓動而化精微生津 而温暖暖則陽和敷布健運不停胃爲陽土喜滋潤 雨以潤之木有不欣欣 向榮者乎脾爲陰土喜香燥 降清升機掘自利矣若肝 液 賜

察者故治虚損而不知緩急先後進藥之厚者未可 病者之調護不然功不 逮過亦徒勞耳〇再按虛 與議也補偏救弊轉危為安雖在良工之用心尤要

過

升胃氣被逆或脾氣因弱飲食難消皆當隨時審

成脑疾头 無不確信為虛而釀 西不 量而見小效故

者一

**濇補之味漸漸敏痰入** 

於包絡旋發旋重或變風癇

作虛損怔忡而用補劑不知有痰凝氣滯變火冲動 故總名內傷如前所論是也若假者似是而非或不 則餘可 辨而誤服補藥變成敗壞之證反不可治矣姑舉數 **有與假之分光不可不辨本元虧為虛臟真傷為** 一投參地棗仁萸肉等藥初不之覺或見小效而 類推也一凡心 姚頭眩夢寐不安者世俗多

等門 法 词 · 关二 虚損論

抽 掣 不

省人事甚則癲

**狂不可 救治夫虛損而至** 

落

或 數、 常兩關寸沉遲 因 動 如怔忡甚或昏厥 **日觸怒勞心心肝** 痰凝火鬱者外證 大肝 先因腎虧勞心耗 ML. 異病時, 不養肝肝 脈急强乃為 ~ 弦濇以 小關 風 雖 但 火 沉 動為 其清陽 似。 滞而尺 用 冒 血 木 水不濟火虛火上 理氣清痰則變火解 火 而頭眩其心腎之脈 而 (偏勝陰· 痰 脈 部或見浮大 涎毯過火不得 不振氣滯疾凝故 則逈異尺部沉靜 血虚損之象 一冲心 必 浬 m 神 病

推勘 脈理甚欲故必反覆

因延獨阻於中焦而

下焦陽氣不能上達之故

為真虛但理中上二焦使氣順痰清其尺脈亦即平 復如果細審有兼腎虧 者亦必使關寸之脈調達

無濁涎所阻方可滋補否則氣血未滋而痰涎更結

凡咳嗽或因風寒外閉而嗽痰或因風熱內

而干咳若作虚損而誤補則邪氣內伏反覺小愈於 病者皆信為虚更進補藥邪與氣血膠結 如

其故也

是殿門者

油

人麵

神丹莫療或邪人鬱動火而吐血則更認

ショウ 日

/ 11. 加川倫

淺學未能明察皆為

小范所迷至死不悟

1

而似迷終至不救而 誤而至百誤愈誤

真至死不悟可勝悼哉夫虚損咳嗽雖亦有發熱之

證然咳聲無力兩頰常紅其尺脈空虛而數肺脈虛

既非 或肺氣室塞聲閉不出 勞損或邪火走注 材 19 光二 一身皮肉筋脈背痛則認為血枯 則認為啞勞而不知由假成

大並不拉滯皆由腎傷水耗相火上炎犯肺方可 一冬参地之屬若脈雖弦數肺部沉滯此風寒外閉

既不虚則肺火自 或肺脈雖大而有力尺部不虛是邪鬱化火皆非虛 損而當清理 泄邪其初 起必有惡寒發熱之

婚卵

ハ

多

無力

**杨光失當必成病根** 

固氣 勞咳嗽由漸而來外邪咳嗽卒然而至迫有可辨 邪鬱火冲動或受熱邪動血皆當清邪化瘀令觀 一凡吐血共因甚多或因 調中或因暴怒氣逆動 川力動火須用 líL) 須 順氟化瘀或 和絡化瘀 因 办

所月報局明 に二虚損論 時復吐 結於絡 吐則又補愈後又發旋發旋直終至不救其 中) 續生新血不能循行歸經滿 則必溢故

因用力及暴怒動血者得京潤脈補血雖暫止瘀

俗多不細辨一見吐血率用二冬二地阿膠等類

其一許因尤為要看 

血

自止飲食調理

漸

胃絡必當審其所因以

暴怒傷肝肝脈大而尺

脈不虛旣非虛損其血出

清理化瘀為主瘀化氣和

固 可數計竭心力治之全愈者十無一二半愈者十 外邪吐血 杉 リノノニ 而誤補者變證尤多以上諸弊余目擊

殊不思虛損吐血總因 即為萬幸醫者不悟自 無三四或吐血雖不發 以為是病者畏虛皆於補死 而咳嗽終身不瘳帶病延年 肝肾同傷尺脈必然虛動

知對理不能不滿鬼 病家無可折衷既不 吾見死於此二說者 不知凡幾英傷哉

之證治乃日攻邪所以

救正邪去則正自復也二

君子多小人自退也其 慣於用攻者不知實中挾虚 虚實之脈證則虚者誤 攻是故慣於用補者既不識 外邪證治之法乃曰但 不明六氣外邪之脈證 如勿藥之為善乎嗚呼 余豈好辯哉蓋不得已 補其正正氣旺則邪自除循 則質者誤補不明人身陰陽

加其情亦可哀也 路門奉易 &二處損論 各執一說似是而非病家惶惑莫知所從不得不禱 於鬼神而求神藥或用香灰代藥散噫理之灼然可

之醫故人不死於病 乃止有治純虛純實 世多虚實錯雜之病 質錯雜之證多也正 尚易純實者攻之不難無如純虛純實之證少而

之深淺而用藥有輕重緩急之別也然純虛者補之

者有風寒暑濕燥火之不同受病有臟腑經絡表裏

於鬼神乎夫正虧為虛 単「オロ」えこ 腎也氣血虚者須調脾 胃以氣血生於脾胃也邪實 **虛氣虛血虛之異陰陽虛者須培腎元以陰陽蓄於** 明者猶難取信而欲希 驗於冥冥中其誠果能感格 不盛為實正虛者有陰虛陽

**泛似之称以致之乎** 道人心之不古所以 即必死於醫苑亦世

急或攻多補少或攻少補多隨證設法惟求恰當是 陽氣血熟者為虛經絡臟腑 也世俗習於時尚而昧古法反以為 故古方補 虚質錯雜之證則東手無策也夫 攻法則正氣脫 **冯同用寒热並陳者甚多內經所謂複** 不知 理動手創乖故必審其陰 何處受邪權其輕重 怪而不敢 所以枚 用

<u>.</u>

1.5

上 虚損論

相牴牾其害

則同

風寒之邪初

即可社

邪原有至理但必

混淆若

發散表之 图 **痛其人元氣不虧可** 能退或屢表不汗神氣 **参芪歸芍之類佐以疏 散補** 此皆所謂攻其邪 邪鬱在表身中陽 元素虧初處風寒 利淸穀當用姜 14 卷二 汗出則身凉 **邓去** 氣 則正自復也如或雖汗邪 大黃等藥攻下則邪去而 委頓此中虛不能勝 而愈又如熱邪內結腹滿 附理中等湯以扶元陽 不伸故身熱頭痛 刨 入陰經但冷不 托解邪則汗出身凉! 热或厥 但 用辛温

邪之陰陽清濁不同 則治法追募矣 病之浅深表裹各別

初受卽

踞胃口、

艇、

虚弱人不能用補

則,

鄉其

ここえ 角

切

庸

問 伏得食即復發故最淹纏難愈非如風寒邪 在 諭風寒之邪耳若暑濕則叉大異暑濕從口鼻吸受、 寒自去此皆所 由 肺胃間邪入 不食肺胃現證也愈後多日胃尚不開或餘邪 膜原而走中 禁食可用 補法也夫藥之入口 膜原肺胃皆病所以暑濕初感、 道漫延三焦故必分三焦論治膜 訓補其正正旺則 邪自除也然此 必、 先、 九到胃暑 在. · 鄉売、 刨 꼐 14

實非易事難其淺學

组

医第1 故 必先為 清理、 十二 品作品 惟

之緩峻使邪氣傳化正氣流行方可 濕無形之 攻 쇴 則 進退瓦 揙 邪正自復者 漸復邪氣漸消庶可生全是則所云補 去如不中立 相勝 邪、 雖 一或從汗解 旃 負此中消息尤當細心體會必使 供。 滿悶而按之虛軟化其三焦之氣 權 不可用矣且攻擊之藥中於病 則攻其元氣而邪反不去即如 其體之强弱邪之輕重以準 清補 正邪自除 兼施其邪

邪

大黄者迅利峻下直走

2017年1日の 位二世道論 虚 之不當縦其人本元未虧邪亦由此輕減面元氣無 呼不明至 則 且其無形之邪本 冒若有形積滯結於腸胃核之堅痛力可用之或用 未有能治之者发辨其概 不傷殘往往病後虛怯難復况本虛之人無不危矣 內陷多成壞證若又不顧供邪在內 邪與氣血膠固難清必至淹纏日人終歸不起鳴 理、 而 偏 在半表半裏攻其腸胃 轨 說以自是則假虛假實之證、 如 此幸 Щ 者學者 [[]] 則表邪 轨 用補

東台沿 用桂附, 難逆莫不用凉藥也 服点藥用死介在時 叉 先傷凉藥殘燄無行 不 實人誤用柱間 救然必辨之的確若 雖用柱附等竟不能 化晒等而愈行 斃蓋實火在心肺問 知有虚陽上奏者 加 四周 PL 恢 八 腫痛飲食 人而兩人 床 加牛 加立 Mej 人 縢

丁亥春仲有七十老人數年前患瘧病 **斯寒假熱治察** [] . 根 除

便干少也余診脈虛濇 屡發或見其小便黃赤大便干而 夏秋則發去冬至春忽病嘔 肝鬱化火火逝 犯胃作唱 少胂觀舌苔白腐 胃陰不足故小便黃赤 叶 戰振筋脈掣痛愈後 少面 有紅光謂 而厚因

中焦虛寒濁 **逆胃陰不足也病家惶惑未知** 陰 **聚胃故**‰ 是胃陽不 孰是余遂辨之 振,非

閉故也虛火脈必無 皆是在紅或淡或痰 温尘紫而廣爛質天 根以此為辨或歷火 **旁** 進展亦敬而色不 故但喉旁腫硬其色 而不流利以風火內 尺脈沉實计關搏指 必經濟下垂甚長喉 **紫赤而懸雍不甚下 亚瑶莲熳肾故虚火** 或係火邪混引經文中氣不足之語誤用温熱其害 之變中氣不足者中焦虛寒也小便反變黃赤何 辨明或本虚寒而見小便黃赤誤認爲火而用凉藥 焦者决演之官水道出焉是小便之行必由三焦氣 則小便清白此常理也然經叉言中氣不足溲便爲 中有妙理若不細心體會欲得其旨豈不難哉倘不 化而出三焦為少陽相火故火盛則小便黃赤火衰 膀胱者州都之官津液藏馬氣化則能出矣又日 The Part And Dick

**公法**临谷自註 处邪再用引火歸原

而後盛於下水

有餘者必先盛於

而

後

不足以語此知常通過非悟道者

外邪須先表散 医足 均也夫火炎 林四里 卷二重與作素治等 水流下自然之性也故火有餘者必

盛於上 故名為焦取火熟物之義相火足氣化行則 性火若以寒冒之則屈伏在 相 火用 事熟腐水穀而化精 常理也然水激之 可使在山失其就 下失其炎上之威三焦 微生津液而通水道

不混故日上焦如霧中焦如漚

中焦虚寒不能化氣

·則胃

**刘此解**經

延濁陰凝聚而衰弱之火勢必不能炎上而屈

水道不暢小便反變黃赤此所以中氣不足溲便

如此辨證方合聖經

爲變也其大便干

·而少者仲景日脈沉而遲不能

之理

俗見大 身體重大便反鞭鬥名曰陰結此謂陰寒凝 食而大便干少正仲景所云之陰結也然則何以 便堅難多作 火治誤矣今脈虛牆身重 思

**然者**不知所以然之 美里司 上下口五 /以一真寒假執治案

自古多觀舌苔以辨

之則當辨之於舌舌為心之苗心爲君

火色本赤

證從未有道其所以

焦為相

火脾胃為中土火土相

生氣。

上上

悉能知其所以然之 陰陽玉行造化之妙 乎何世俗之多醫耶 理哉嗚呼爲豈易事 職也與者 **不辨也非深通乎** 可辨假

酸培土

和

甘

濁

濁陰已盛斷非胃陰不足矣若胃陰

吾不敢過而問也 則常 E者可識變者 有生氣 膩者 宜辛温苦 胃中陰濁疑聚也其色若黃黃為土之本色十 生土者火火與陰濁交混而成濕熱之邪 肝以其土無生氣故不納食胃陽 热或清或濁其狀其色必現於舌舌苔厚 降以祛濁佐凉以清火若色白者白為 氣相火衰弱已極必用辛熱助陽化濁

則

臣門村

枝芍藥烏梅草果仁一 由膜原必有結邪故病發嘔吐一而畏寒發戰營衛 其紅自退是面紅便少而赤者上下之假熱舌苔白 焦濕聚氣化不行下焦反燥故大便干而少也其 確乎不易者也口 腐者中焦之真寒且脈虛濇非火可知又兼瘧病根 通也遂用姜製牛夏爲君佐參苓附子干姜生姜桂 紅光因嘔多肺氣逆虚火浮於經脈之故肺氣順 中並不酸苦亦非肝火上 劑卽甚效繼又去烏梅加 一逆矣 间

亮程恳以千里直假 不游死生反掌可不

虚心力學以免害人

其大便反溏小便反清蓋三焦氣化則水道行 門棒喝人卷一 連進十

·餘劑每

劑附子用至三錢胃口開而病愈

in

隂

濁 也 미 知眞假之 辨必以經義為準若諸家之

而濇似虚者但必數 瘟疫之脈亦有沉細 因濁邪也熟之故 開 多似是而 一機濁之邪包熱在內其人必昏憤發熱須達原 脈證不 泄 膜原結邪熱即透發若誤作虛寒其害不 可固執 不可 為據也然白苔雖多中寒更須參 卽 如瘟疫初 起舌苔厚 白 如積

上真寒假熱治案

其邪透達則脈路亦

必當

脈證

互参

故內經云有者求之無者

JE

陰也余在粤時有蕭山何先生夏月不爽自謂受暑 毎日强飲薄粥 食西瓜 也又如濁邪包熱者苔雖白其舌本必紅赤非如虚寒 有苔垢而干枯者濁邪旣結津液又傷必須兼養胃 又如舌紅而光若不干渴亦不可盡作胃陰不足雖 虚者責之實者責之此辨別不易未可但憑 温暑治案 大枚叉服凉藥數帖後無所苦惟胃不開、 E 二鐘甚無味尚行動自如小便

ヨユラギ ムロだに

腎氣暑爲有根若再服凉藥必死遂用附子理中湯 藥余日此證固非火邪舌雖光不欲湯飲亦非胃陰 黄大便干多日不 按之至骨紫紫如蛛絲而已醫者獨言有火而進凉 光無苔酷似胃陰不足但不喜湯飲脈則浮中皆無 去朮加當歸桂枝以養榮數劑後毫無效驗又去 不足脈微如是元陽大虧幸而小便淡黃大便堅 加肉桂吳茱黃茂等連服十餘劑依然 解胸腹無脹悶面色如常舌紅 温柔的 固、 加

日不納食脈如蛛絲

間二十餘日不出大便胃 當歸參武從松廣皮等温 形 而飲行動如常余乃屏去熱藥重用鹿角膠佐枸 五日以觀之亦只如是百 劑共服大熱樂已三十餘劑仍復如此余細思其小 便通大便干則腎元未絕, 稍粗、 成條沉細如髮出大便些須仍干又進前藥十 飲食暑加叉服十 劉其胃始開脈亦漸充 . 品質台於 味烹調皆不喜粥亦勉强 何以胃總不開令停藥四 開後大便一二日即 潤養陽連服十劑始覺脈 餘 <u>祀</u>

坐何 體核葉也故云脈疟 命蒂脈者根本 能久也人病脈不病 脈粗反軟弱不 氣及少故肢體乏力 者生其胃問食進元 强中载虚氯鼓外不 人不病者死以其外 可不知蓋元氣稟於 氣脈漸歸根外數之 天街能行走目開 也中有至 也版 能耗 之氣為最故其功 生氣幾竭矣鹿角不須一 然服助陽大熱藥三十餘 此真奇病也,仲景曰脈紫 伽 公本面白氣虛之人年逾 反軟弱 FE. 如温暑之 艸木無情 臥牀不能起坐 不及 勝 怕. 內 於 桂 7月即長至数尺其得 阳是桂附 ħ. 紫 帖全然不覺胃竟不開 叉養半月始得 能 何 如蛛絲者陽氣衰也 而見此脈陽衰 助生氣 體盛色白或 之熱可 也 以 極、 何

舊也 旺行於肢體方能復 而 那形充实久而

氣 丽 先用辛 陽虚凉藥人口中 如兼厚腻舌苔者此熱伏 辨舌舌雖邊黃中必 **肌鬆者本質陽虛凡感** 温通陽使中陽振 大凉遏 氣 白洲 先餒 乃熱邪 舌 不能 熱邪往往凉藥不效以其 濕中尤當先用辛温開 نار 亦黃再用凉藥即 運藥驅邪故 外受中卻虚寒 也 此 解 湛

.... 温唇冶家 知余在粤時

有

體盛

肌鬆之人春令患風温身

愈 或

洞潟

則濕

去

半

火

邪

內陷變證

百

Þſ

倘

見其熱甚驟

用

其濕而

火反伏必淹

難

117

身热不退其邪反鬱肢體隱隱如疹狀煩擾不安觀 辛凉不能解熱也乃用二陳湯加附子 熱滿舌皆黃再用辛凉加霍朴數劑隨愈 古邊黃中白而皆滑始悟其中寒外熟而有濕痰故 大泄熱邪內陷叉兼少年 以 又有一面白體盛人夏月患暑温服凉解敷帖而愈 頭編咳嗽喉疼屢用辛凉踈解咳嗽喉疼差愈而 邪輕故也旬日復感自服蘇合光覆被發汗沫 棒嗎卷二 多欲其脈空數無根余 一劑其身大

温力 陷命必倾危

以其走竄泄津液辛 熱邪使正傷邪 以難治蓋蘇合九中冰麝等辛温走鼠治寒尚 暑 大忌也勉進甘凉薄味之藥養陰和陽四五

熱愈熾余不能治病家篤信不肯更醫一 舌有薄苔邊淡黃中白滑 象稍 餘 日病 轉而尺部甚至身熱不退夜則臟語天 不增減藥稍跛利則委頓不堪稍 每日飲粥二三碗如是十 補 H 助則 因換 明卽 Ħ 脈 清

多国 番 7 脈象雖虛 本局というたこ 數無神尚 一温暑治案 不 於卽 脱因思其二 r\*. 便

起

動即大汗

D

開、

眼閉

欲脫余急視之幾

如

死

細

用

医区 1 **先**二

欲 通, 能 脫、 進粥食胃氣未絕胸腹不脹 不得不先扶本元且因多欲腎虧而粵東木 則腑 氣無礙 正氣 火

艺 越 則下 地肝風易熾常多痙厥故参不能用恐助虛陽 元根脫乃用熟地一兩二錢附子四錢厚

寐二更醒後又服 一錢合二陳湯 如數煎一大碗黃昏時 一 半 亦無所覺子後仍讝語 服 半、 天明 卽 熟

有神 用白虎湯加細 而加數舌苔中心亦黃胸 地等連 腹

仍寬能進粥食

則清余視之脈稍

誠之所感如是夫思之思之神必啓之

矣因病家篤信不獲辭藥總不效徹夜思之未得 細 脈 且沉固思畫清夜昏為熱入血室血室脈陰所主故 生地之類五六服全然不效此時已 知刺法乃用歸鬚亦芍新絳青蒿鱉甲柴胡黃芩 漸 獨滯而仲聖有刺期門之法是邪結 加惟 身熱不退夜 仍讝語左關 月有二 血分也余

野門 理倦 陰暑濕濁 極而寐醒後忽記來復丹方中有靈脂專入 棒唱人卷二 邪與傷力 温暑治案 寒不同故前藥不 效靈脂 夫 厥

濁 矣因其少年多欲 於前方去柴胡送來復丹 色深碧稠 是病 一曉 之熱入血室病 有硝 則 加 無讝語又連 磺直達 用 此 如膠 來 至陰 黎病家燃疑詢 復 濕 同 熟之 丹以濁攻濁 M) 進三服身熱 助 那 邪、 本 不 錢果 乘虚 元 同、 陃 以 邪 所以 袪 余余日此 削 然神效夜 陷 難 不同故藥 退、 邪 入肝腎 神 忽解 必當奏功 比上 效 也所謂 即安 病 小 故與傷 便 根 除 甚 睡

昔人言精於仲景法 若可以治萬病今觀 先生辨證設方真能 師法仲景者妥故信 手拈來頭頭是道世

以泄熱和入煎熟附子汁扶陽其法炒矣以上 思無從着力或多延數醫亂投雜試則萬無生理矣 劑而愈嗚呼此證若非病家篤信專任余雖協盡 仲聖治傷寒變熱之邪內陷用苓連大黃水漬取 兩證

公司本國人 兼腎元空虛先救其本故又重加熟地慮其礙中 非熟地附子先扶腎元邪陷至陰之經而正氣將 加厚朴皆師仲聖之意而變化其法 之二温暑治案 因宜裁制 = 也

以外熱中寒而挾痰先治中寒用一

陳加附子

或問熟入血 室畫則明了夜發膽語何也答曰人之 **侠高明教之并為臨證者鑒焉** 百月 本 月 / 久二 衞 動至夜衛氣入陰與邪角爭則擾亂神魂而發譫語 行於陽分畫當陽旺之時心神自清邪伏於陰而不 叉何能使邪外出乎若腎元旣空腑氣叉室者熟地 不能進参叉不可用則為無法可施矣管見是否以 氣畫行於陽夜行於陰邪入血室至陰之地衞氣 : ī

衝脈為血海故昔人指血室為衝脈然肝為

手引 ミリーシー温 沿治案 聖之遺意也 男子則必從肝經治之此來復丹 肝之募也婦人經水由衝脈而下其邪或得隨下若 之地故血海爲肝所主而仲聖有刺期門之法期門 法亦可推廣仲 Ξ

醫門棒喝卷之二終		是
2二終		卷二
		4